diminduated intended in the hatadad

Cruciulita

Vass4R09s491-495



Collection Vassal-Montpellier

Cruciulita 4 R9 S 491. 495 XI 15 A 2 X







DESIGNATION Cucillita CLOS XI PLANCHE AS RANG A souche2 Vigueur : 2 PORT : Frig - 1/2 érig - couché Pédoncule : L - M - C Millerandage : 0 Date de Véraison , 24 7-72 Date de Maturité : 17 8.72 X Pourriture : 0 GRAPPE : G - M - P : L - M - C BAIE : TG - G - M - P 1 X17 disc. - (sph) - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : (BI - Gr) - Rs - Rg - N SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 1 820 avec pépins - apyrène JUS : inc. / coloré s50

DESIGNATION: Cruciulita CLOS XI PLANCHE AS RANG A Souche 2 Vigueur: 2,5 PORT : érig - 2 érig couché Millerandage : 1 Date de Véraison : 28 7 Date de Maturité : 19.8.75x Pourriture : 0.17 GRAPPE : G - T- P : L- H - C BAIE : TG - G- N - P disc. - Sph. - ell. - ov. -COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : avec pépins - apyrène JUS : inc - coloré

DESIGNATION 15 Cuciulita CLOS X PLANCHE RANG A souche 2 Vigueur: 2,5 PORT : (érig - ½ érig - couché Pédoncule : (L)- M - C Millerandage : 0 Date de Véraison: 31 7-73 Date de Maturité : & 8.73 x 1 Pourriture :0 GRAPPE : G - M P : L - M - C BAIE : TG - G M - P 18x18 disc. - sph. ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : (B) Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : S- m - fox - herb. CHARGE : s1 3 s2 3 avec pépins - apyrène JUS : inc. - coloré

Année: 1970 XI 15 A2 ... Désignation / Cruciulita...

	! Total	!	D A	DATES			
	! d'yeu	1 2313 !	!	!	. !	!	
1	14	2 1	!	!	!	!!!	
2	12	10	!	!	!	!	
3	! 3	10 +1	!	1	!	!	
1.	!	!!!!	!	!	!	!	
5	:4	2 + 1	į	!	:	!	

Année:
Emplacement ..... II. 15. A2..... Désignation / Coursi ulita....

	! Nombr	1 !	DATES					
	i d'y	eux! 2-4	!!!!!	1	. !	1		
1	! 2	! 4 1	!!!!	!	!	1		
2	12	111			1	į		
3	12	! 1 d	0 le 2.4	71 1 +3	)!	!!		
4	1:2	!	1 0 4 12.7		!	!		
5	1:8	!	!!!!	1	!	!		

Année: 1973
Emplacement ....XI...15-A2..... Désignation /. Cruciulita

		! Nombre ! Total	DATES				
		! d'yeux	164	1 34 1	1 . !	<u>-</u>	
	1	! 4	! 1	2 1	! !	1	
	2	2	1 1	1	!!!!	!	
	3	1)	!		06 9.6.73	!	
	4	1)	1		00	!	
	5	!/	!		i	. !	

Désignation: Cruciulita
Emplacement: XI 15 A 2

## (A) BOURGEONNEMENT:

A. 1

#### Colonno

41 • épanoui 🛈 - moyen 2 - globuleux 3.

- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

## (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 032 en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 6 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo: mai 65

Cruciulita Désignation :

Emplacement: XI 15 A2 02

# (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonno

Norvures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -

: glabro 4 - séteux 5 - volouté 6 - aranéeux 5 - duveteux 8 - cotonneux 9. Limbe

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmonté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaunc 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -

duvetoux 8 - cotonnoux 9.

totaloment (1) - sillon 2 - particllement 3. 48 -

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni (7) - anguloux 8 - côtolé 9.

glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. 49 entièrement () - partiellement 4.

## (I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - potit 3

morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Vistal-66

Désignation :

Emplacement: XI 15 H2 DD

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

## Colonno

- 50 mérithalle : dos coloré 1 à raies 2 vert 3.

  ventre coloré 7 à raies 8 vert 9.
- 51 nocuds : dos coloré (1) à raics 2 vert 3.

  ventre coloré (7) à raics 8 vert 9.
- 52 vrille : verte 1 jaune 2 rouge clair (3)
  rouge foncé 4.
- 52 bourgeon : coloré 7 vert 8.

# (I) FLEUR

morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Désignation: Crucilla Emplacement: XI 15 A 2' 0.2

### FEUILLE ADULTE.

colonno 34 potite 1 - novenne 2 - grande 3. Face supérioure : limbe et nervures : glabre 4- sétoux 5velouté 6 - aranéeux 7 - duvotoux 8 - cotonnoux 9. Faco inférioure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. limbe : glabro 4 - séteux 5 - velouté 6 -35 aranéeux 7 - duvetoux 8 - cotonneux 9. Linbe: plan O- en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmonté 5. Lobes: plan 0 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tournenté 5. 36 -Surface: unio 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 - plissée au point pétioleire 6. Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4. 37 -Face inférioure : verte 1 - partiellement rouge (5)-38 entièrement rouge 4. Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 vert plombé 4 - autre 5. PETIOLE 39 - long 1) - moyen 2 - court 3. 39 - glabre () - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement8 totalement 8. 40 - aranéoux 4 - duvetoux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8. 40 - coloré () - particllement coloré 2 - autre 3. angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supériour à 90° 3. angle pétiole/raneau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supériour à 90° 3. Calvo 69

Emplacement : Désignation :

Cruciulita

II 15A2 3.2

arba

#### GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

#### BAIE

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8.
- 27 de couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- 27 Très pruinéc 7 pruinéc 8 non pruinée 9. Coloration régulière 1 irrégulière 2.
- 28 Forme: discoïde 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 ovoïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
  - A ombilic persistant ( non persistant 2.
- 29 A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée 7
- 29 A jus incolore (1)- coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne 4 épaisse 5.
- 33 A pulpo charnue 6 juteuse 7 molle 8.
- 30 A saveur neutre 1 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacé 6 spéciale 7:
- 31 A pédicelle long 1 moyenn2 court 3.
- 31 A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6:
- 31 A bourrelet de couleur : verte 7 rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet évident (- peu apparent 2)
- 32 A pinceau : court 4 moyen 5 long 6.
- 32 A pinceau : coloré non coloré 9.
- 33 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile 2.

Calvo 70

Cruciulita

DEMONIHATION :

EMPLACEMENT : XI 15 A 2 A.1

## SARMENT DE VIGNE

: long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2) Ecorce Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatic (3), autre (4). unie (1), anguleuse (2), striće (3), côtelée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3). Surface : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Nocuds Mérithalle de longueur moyenne : ............................ cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4).
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8) : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4) : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descondant (3), rectiligne ascendant (4).

Emplacement: XI 15 A2 2000 8 - Angle des nervures ..... 1 - 2 - 3. 10 - L<sub>2</sub>/L ..... 1 - (2). 11 - Lobes ..... 1 - 3 - 5 - 7 - 9. 12 - S. lat. sup. (prof.) ...... 0 - 1 - 2 - 3. 13 - S. lat. inf. (prof.) ...... Q - Q - 2 - 3. 15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 1 -(2)-(3). 17 - Dents : Méd/B 18 - Angle lob. term. ...... (1) - 2 - 3. 19 - Base nerv. (gar. nu dég.) .... 1 -(2) - 3. 20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. ..... (1) - (2) - (3) - 4 - 5. 22 - Largeur S.P. 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : 1 - 2 - 3. Forme : (4) - 5. Médiane/Base : 6 - 7 - 8,

Désignation: Cruciulita

Nº d'ordre :

Origine :

Domergue